

ZooLac® BOVIMIX

FODERTILSKUD TIL DIENDE KALVE



Indholdet i brochuren er udarbejdet med størst mulig omhu. Informationen er vejledende, for at give inspiration, men ChemVet påtager sig ikke noget ansvar for fejl og udeladelser. Ikke alle produkter er tilgængelige for alle markeder, og lokale lovgivningsmæssige retningslinier for anvendelse og distribution af produkterne, går forud for indholdet i brochuren. ChemVet forbeholder sig ret til at ændre i informationen om produkterne på ethvert tidspunkt, uden forudgående varsel. ChemVet fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab, der måtte følge ved brug af oplysningerne. ChemVet tager forbehold for alle rettigheder til det anvendte materiale, herunder tekster, billeder og logoer.

ChemVet dk A/S, Danmark, tlf. +45 86817522
www.chemvet.dk

- + Gør det nemmere at gå over til plantefoder.
- + For en bedre start på voksenalderen.

ZooLac® BOVIMIX

er et kombinationsprodukt, der består af vinasse og levende gær.


ZooLac® - Vinasse (substrat fra fermentering af mælkesyre).

Gær kan binde bakterier til dets overflade. Bakterier, der opfanges af gær-celler, udskilles efterfølgende. Når kalve går fra mælk til plantefoder, ned-bryder gæren plantefibrene i dele, der er mere letfordøjelige for kalven, og fremmer dermed dyrets udnyttelse af foderet.

Dextrose er tilsat som bærestof, hvilket gør **ZooLac® BOVIMIX** let at opløse.

ZooLac® BOVIMIX stabiliserer fordøjelsen og balancen i mikrofloraen i tarmen.

ZooLac® BOVIMIX - resultaterne af en nylig undersøgelse af kalve i Danmark (administreret ved 6 uger) ⁵.



4 gode grunde til at forebygge hos kalve:

1. Kalve, der behandles for diarré, har en 2,9 x større risiko for at kælle første gang efter mere end 30 måneder. ¹
2. Risikoen for åndedrætsbesvær hos kalve, der lider af diarré de første 90 dage af deres liv, er op til 478 x højere. ²
3. Kalve, der lider af mild diarré de første 90 dage af deres liv, producerer mindre mælk ved den første laktation end kalve, der ikke har haft diarré - i gennemsnit 344 kg. ³
4. Kalve, der vokser 100 g eller mere dagligt, har en større mælkeproduktion, 155 kg, under den første laktation. ⁴

Referencer:

- 1 Waltner-Toews, Can J Vet Res 1986
- 2 Svensson et al. Prev Vet Med, 2006
- 3 Svensson & Hultgren, J Dairy Sci, 2008
- 4 Soberon & Amburgh, Am Soc Ani Sci, 2013
- 5 Thorsteinsson & Vestergaard, J Ani and Feed Sci, 2020

Dosering og anvendelse:

Køn	Dosis
Kviekalve	1 g ZooLac® BOVIMIX/liter
Tyrekalve	2 g ZooLac® BOVIMIX/liter

I særlige tilfælde (stressede situationer) kan dosis øges med 2-3 gram pr. liter i 5-7 dage.

Før administration: **ZooLac® BOVIMIX** opløses i kolostrum, mælk eller mælkeerstatning. Administreres indtil fravænnning.

Pakning: 10 kg i plastikbeholder. Et målebæger leveres med pakningen og svarer til 90 g af produktet.

Holdbarhed: 1 år efter fremstilling.

Opbevaring: På et tørt sted ved normal rumtemperatur, i den originale, lukkede beholder.

ZooLac® BOVIMIX står for:

- bedre sundhed
- bedre vækst