

Anvendelse



Tilskudsfoder til dækning af dyrets ernæringsmæssige behov.



I nye situationer, f.eks. transport, ændring i foder m.m.



ZooLac[®]PROPASTE[®] er et naturligt produkt og kan ikke overdoseres.



ZooLac[®]PROPASTE[®]'s unikke sammensætning gør det til markedets bedste i sin gruppe.

ZooLac[®]

PROPASTE[®]

TILSKUDSFODER TIL DYR



Indholdet i brochuren er udarbejdet med størst mulig omhu. Informationen er vejledende, for at give inspiration, men ChemVet påtager sig ikke noget ansvar for fejl og udeladelser. Ikke alle produkter er tilgængelige for alle markeder, og lokale lovgivningsmæssige retningslinier for anvendelse og distribution af produkterne, går forud for indholdet i brochuren. ChemVet forbeholder sig ret til at ændre informationen om produkterne på ethvert tidspunkt, uden forudgående varsel. ChemVet fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab, der måtte følge ved brug af oplysningerne. ChemVet tager forbehold for alle rettigheder til det anvendte materiale, herunder tekster, billeder og logoer.

ChemVet dk A/S, tlf. +45 86817522
www.chemvet.dk

ZooLac[®] PROPASTE[®]

- ✓ **Enestående praktiske resultater gennem mere end 15 år.**
- ✓ **Sikkert gennemprøvet produkt med stor succes.**
- ✓ **Markedets bedste i sin gruppe.**
- ✓ **Fremstillet ved fermentering.**
- ✓ **Råvarer af høj kvalitet.**
- ✓ **Godkendte indholdsstoffer.**

ZooLac[®] PROPASTE[®]

Brugsanvisning

ZooLac[®] PROPASTE[®] tildeles ved hjælp af den betjeningsvenlige doseringsprojette, som udgør produktets emballage. Inden tildeling indstilles sprøjten på den ønskede mængde, som ses af doseringsskemaet. Den afmålte mængde **ZooLac[®] PROPASTE[®]** placeres på dyrets tunge eller ovenpå foderet. Selve tildelingen foregår let, idet dyrene kan lide **ZooLac[®] PROPASTE[®]**.

ZooLac[®] PROPASTE[®] opbevares ved almindelig stuetemperatur.

Hvis produktet opbevares i køleskabet skal det tempereres til stuetemperatur før brug.

Naturligt produkt

ZooLac[®] PROPASTE[®] er et naturligt produkt og kan ikke overdoseres.

Dosering

Doseringen er angivet i nedenstående skema:

Dyrets vægt	Dosering	Dyrlægens notater
0-10 kg	1 ml	
10-25 kg	2 ml	
25-50 kg	3 ml	
over 50 kg	5 ml	

